


Perkutane Embolisation eines Aneurysma spurium

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient

Bei Ihnen wurde eine Aneurysma spurium einer Arterie festgestellt. Ein Aneurysma spurium ist eine kleine Aussackung des Gefässes, die von Blut aus der Arterie durchflossen wird. Ausgangspunkt der Gefässausstülpung ist die Stelle, an der für die kürzlich durchgeführte Gefässuntersuchung punktiert wurde; die Punktionsstelle in der Arterienwand hat sich nicht vollständig verschlossen. Um eine Grössenzunahme und das Risiko einer grösseren Blutung zu verhindern, muss die Ausstülpung verschlossen werden. Dies kann entweder durch eine Operation oder aber durch ein Einspritzen von Gewebekleber in die Gefässausstülpung erfolgen. Die Variante mit dem Gewebekleber ist einfacher, schneller und weniger belastend.

Vorgehen

Ultraschallgesteuert wird eine ganz feine Nadel (ca. 1 mm im Durchmesser) in das Aneurysma geschoben und unter Sicht werden einige Milliliter Gewebekleber gespritzt. Da durch den Kleber manchmal die Nadel verstopft bevor das ganze Aneurysma zu ist, muss man gelegentlich ein zweites Mal stechen.



Komplikationen

Wir haben bei uns bisher keine nennenswerten Komplikationen gehabt. Wenn das Aneurysma sehr gross ist, kann es sein, dass man es mit dieser Methode nicht vollständig verschliessen kann und trotzdem operieren muss. Bei unübersichtlichen Verhältnissen ist es theoretisch möglich, dass etwas Gewebekleber in das Gefäss gelangt und dort zu einer Verstopfung führt, auch hier müsste man je nach Ort und Schweregrad des Gefässverschlusses eventuell operieren. Bei uns ist diese Komplikation noch nie aufgetreten. Entzündungen der Einstichstelle sind sehr selten.

Nachbehandlung

Wenn das Aneurysma vollständig verschlossen werden kann, braucht es keine spezielle Nachbehandlung. Da der Körper aber das geronnene Blut abbauen muss, werden Sie während einiger Zeit noch eine leichte Schwellung und Verfärbung feststellen. Melden Sie sich bei Ihrem Hausarzt oder auf der Notfallstation des Spitalzentrums, wenn die Schwellung in der Leiste wieder grösser wird, wenn Sie zunehmend Schmerzen an der Einstichstelle oder im Bein haben oder wenn Gefühlsstörungen im Bein auftreten.

Je nach Ausgangsbefund werden wir mit Ihnen einen Termin für eine Ultraschallkontrolle vereinbaren.

Einwilligung des Patienten

Ich wurde über den Eingriff aufgeklärt, habe den Aufklärungsbogen gelesen und verstanden. Ich hatte Gelegenheit Fragen zu stellen. Ich bin mit der Durchführung des Eingriffs **einverstanden**.

Name:..... Vorname:.....

Datum:..... Unterschrift:

Visum Radiologe:

Ich bin mit der Durchführung des Eingriffs **nicht einverstanden**. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass sich dadurch die Behandlung verzögern und erschweren kann.

Name:..... Vorname:.....

Datum:..... Unterschrift:

Visum Radiologe:

Der Patient ist nicht einwilligungsfähig:

Name:..... Vorname:.....

Datum:..... Unterschrift:

Visum Radiologe: